



Клинические рекомендации

Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем:
N31.0/ N31.1/ N31.2/ N31.8/ N31.9/ G83.4/ G95.8

Возрастная группа: Взрослые

Год утверждения: 2025 **(пересмотр каждые 3 года)**

авторы клинических рекомендаций:

- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"

Утверждены

Российским обществом урологов



Согласованы

Научно-практическим советом
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации
13 марта 2025 г. (протокол № 46)

Оглавление

Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей.....	Ошибка! Закладка не определена.
Ключевые слова.....	4
Список сокращений	5
Термины и определения.....	6
1. Краткая информация.....	8
1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	8
1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	8
1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	8
1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем	8
1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	9
1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	9
2. Диагностика	11
2.1 Жалобы и анамнез.....	13
2.2 Физикальное обследование	14
2.3 Лабораторная диагностика	16
2.4 Инструментальная диагностика	17
2.5 Иная диагностика	20
3. Лечение	22
3.1 Консервативное лечение	23
3.2 Хирургическое лечение.....	28
4. Реабилитация	33
5. Профилактика.....	35
Организация оказания медицинской помощи.....	35
6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания	37
Критерии оценки качества медицинской помощи	39
Список литературы	40
Приложение А1. Состав рабочей группы	47
Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций.....	48

Приложение А3. Связанные документы.....	49
Приложение Б. Алгоритмы ведения пациента.....	50
Приложение В. Информация для пациентов	51
Приложение Г1. Шкалы оценки, вопросы и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях.....	52
Приложение Г2. Дневник мочеиспусканий	56
Приложение Г3. Распространенность различных видов НДНМП согласно международной литературе	57

Ключевые слова

- Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей
- Недержание мочи
- Хроническая задержка мочи
- Периодическая катетеризация
- Самокатетеризация
- Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)
- Цистометрия
- Профилометрия внутриуретрального давления
- Ботулинотерапия
- Автономная дисрефлексия
- Гиперактивный мочевой пузырь
- Детрузорно-сфинктерная диссинергия
- Нейрогенная гиперактивность детрузора
- Повреждение спинного мозга
- Травматическая болезнь спинного мозга
- Рассеянный склероз
- Стрессовое недержание мочи
- Ургентное недержание мочи
- Симптомы нижних мочевыводящих путей
- Катетер для самокатетеризации
- Катетер для самокатетеризации лубрицированный с гидрофильным покрытием

Список сокращений

- АД – автономная дисрефлексия
- ВМП – верхние мочевыводящие пути ГАМП – гиперактивный мочевой пузырь
- ДСД – детрузорно-сфинктерная диссинергия
- ИМП – инфекция мочевыводящих путей
- МКБ 10 — Международная классификация болезней 10-го пересмотра
- МП – мочевой пузырь
- НГД – нейрогенная гиперактивность детрузора
- НДНМП – нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей
- НМ – недержание мочи
- НМП – нижние мочевыводящие пути
- НСУ – нерасслабляющийся сфинктер уретры
- ПСМ - повреждение спинного мозга
- РС - рассеянный склероз
- СНМ – стрессовое недержание мочи
- СНМП – симптомы нижних мочевыводящих путей
- УЗИ — ультразвуковое исследование
- УНМ – ургентное недержание мочи

Термины и определения

Автономная дисрефлексия – это внезапная и усиленная реакция вегетативной нервной системы на различные стимулы у пациентов с травмой или нарушением функции спинного мозга на уровне Т6 сегмента или выше него. Она определяется как повышение систолического артериального давления >20 мм рт. ст. от исходного уровня. Автономная дисрефлексия может сопровождаться симптомами (головная боль, нечеткое зрение, заложенность носа, пилоэрекция, гиперемия лица, повышенное потоотделение выше уровня поражения (вазодилатация), бледность и холодная кожа (вазоконстрикция) ниже уровня поражения или бессимптомно.

Асептическая периодическая катетеризация – это периодическая катетеризация, которая выполняется с соблюдением стерильных условий. Предполагает дезинфекцию гениталий, применение стерильных катетеров, медицинских инструментов и перчаток.

Гиперактивный мочевой пузырь (также ургентный синдром или синдром ургентности - учащенного мочеиспускания) – это синдром, включающий в себя несколько симптомов, таких как ургентность, обычно в сочетании с учащенным мочеиспусканием и ноктурией, иногда сопровождаемая недержанием мочи.

Дневник мочеиспусканий – это регистрация времени и объемов мочеиспускания, эпизодов НМ, использования прокладок, а также прочей информации, включая потребление жидкости, степень ургентности и недержания мочи (НМ).

Катетеризация – это техника опорожнения мочевого пузыря или кишечного резервуара для мочи, предполагающая использование катетера.

Катетеризация длительная – это установка постоянного катетера, который остается в мочевом пузыре, резервуаре или кондуите на период времени больший, чем одно опорожнение.

Недержание мочи – это любая непроизвольная утечка мочи.

Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей (НДНМП) – это нарушение функции нижних мочевыводящих путей, развивающееся вторично к подтвержденному нарушению иннервации.

Периодическая катетеризация – это опорожнение мочевого пузыря или мочевого резервуара при помощи катетера с последующим его удалением. Может выполняться в виде «самокатетеризации», когда манипуляция осуществляется самим пациентом, либо выполняется другим лицом (врачом, медсестрой или родственником).

Периодическая самостоятельная катетеризация (самокатетеризация) – это катетеризация мочевого пузыря, которая выполняется самим пациентом.

Стрессовое недержание мочи – это непроизвольное выделение мочи из уретры при физическом усилии, чихании и/или кашле.

Ургентное недержание мочи – это непроизвольное выделение мочи из уретры, сопровождаемая ургентным, повелительным позывом к мочеиспусканию.

Чистая периодическая катетеризация – это проведение катетеризации мочевого пузыря с соблюдением

«чистых» условий. Предполагает использование одноразовых или многоразовых катетеров.

1. Краткая информация

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей (НДНМП) – это расстройства, связанные с накоплением мочи и опорожнением мочевого пузыря, развивающиеся вторично вследствие неврологического заболевания [1, 2, 3].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

НДНМП может быть вызвана различными заболеваниями и патологическими состояниями, характеризующимися нарушениями нервной регуляции НМП. Любые повреждения нервных структур, контролирующих деятельность НМП, могут быть причиной нейрогенной дисфункции. Характер и клинические проявления НДНМП, главным образом, зависят от локализации и степени выраженности неврологических нарушений.

НДНМП может сопровождаться развитием осложнений, наиболее опасным из которых является нарушение функции почек. Поскольку выраженность симптомов не коррелирует с вероятностью развития отдаленных осложнений [4], необходимо выявлять пациентов с нейрогенной дисфункцией и определять группы с высокой степенью риска развития осложнений (высокая/низкая). Риск повреждения верхних мочевыводящих путей (ВМП) и почечной недостаточности намного ниже у пациентов с медленно прогрессирующей патологией нетравматической этиологии, чем у больных с травмой спинной мозга или spina bifida [5]. Тактика лечения и схема наблюдения зависят от типа нейрогенной дисфункции и основной причины ее развития.

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

На сегодняшний день отсутствуют точные данные о распространенности НДНМП в общей популяции РФ и в других странах, но есть данные о частоте встречаемости неврологических заболеваний и относительном риске развития на их фоне НДНМП. Важно понимать, что большинство приводимых показателей имеет широкий диапазон значений в связи с различиями в когорте (ранняя или поздняя стадия заболевания), небольшим числом пациентов и низким уровнем доказательности в большинстве опубликованных исследований (Приложение Г3) [6-29, 30].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Невро-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках (N31):

N31.0 – незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках;

N31.1 – рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках;

N31.2 - нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках;

N31.8 - другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря;

N31.9 - нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная.

Другие паралитические синдромы (G83) и Другие болезни спинного мозга (G95):

G83.4 - неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста;

G95.8 - спинальный мочевой пузырь, вследствие поражения спинного мозга.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Единой классификации, применимой ко всем типам нарушения мочеиспускания при неврологических заболеваниях, не существует вследствие многообразия возможных повреждений двигательных и чувствительных участков иннервации органов, участвующих в мочеиспускании. С практической точки зрения удобна классификация, основанная на преобладании симптомов опорожнения и симптомов накопления или различных видах динамических нарушений, например, детрузорно-сфинктерной диссинергии.

Характер дисфункции нижних мочевыводящих путей при неврологических заболеваниях определяется локализацией и характером патологических нарушений.

Российское общество урологов разделяет НДНМП по уровням поражения центральной нервной системы с характерными уродинамическими характеристиками [3]:

- о Надмостовые поражения с уродинамическими признаками гиперактивности детрузора;
- о Поражения на уровне спинного мозга с уродинамическими признаками гиперактивности детрузора и/ или детрузорно-сфинктерной диссинергии;
- о Поражение на уровне крестцового отдела/ниже крестцового отдела с уродинамическими признаками гипоконтракtilности и/или аконтракtilности детрузора [3].

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Жалобы могут включать симптомы, связанные с фазой накопления и/или опорожнения мочевого пузыря, такие как отсутствие мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание или недержание мочи. Симптомы накопления и опорожнения при

неврологической дисфункции НМП определяются характером и локализацией поражения нервной системы. Для надмостового уровня поражения нервной системы характерны симптомы накопления, для поражения на уровне спинного мозга - как симптомы накопления, так и симптомы опорожнения мочевого пузыря, для поражения на уровне крестцового отдела/ниже крестцового отдела – симптомы опорожнения. У пациентов с когнитивными нарушениями жалобы обязательно сопоставляются с данными объективных обследований.

2. Диагностика

Критерии установления диагноза/состояния на основании патогномоничных данных

Для нейрогенного стрессового недержания мочи:

1. Наличие в анамнезе эпизодов недержания мочи, связанных с физической нагрузкой, кашлем, чиханием, ходьбой, изменением положения тела или другими состояниями, приводящими к повышению внутрибрюшного давления.
2. Наличие в анамнезе неврологического заболевания, которое может быть патогенетической причиной недержания мочи.
3. При физикальном обследовании – наличие положительной кашлевой пробы
4. При инструментальном обследовании - отсутствие остаточной мочи при УЗИ мочевого пузыря.

Для нейрогенного ургентного недержания мочи:

1. Наличие в анамнезе эпизодов недержания мочи, связанных с повелительными позывами к мочеиспусканию, иногда сопровождающемуся учащенным мочеиспусканем и ноктурией.
2. Наличие в анамнезе неврологического заболевания, которое может быть патогенетической причиной ургентного недержания мочи.
3. При физикальном обследовании – наличие отрицательной кашлевой пробы
4. При инструментальном обследовании - отсутствие остаточной мочи при УЗИ мочевого пузыря
5. При комплексном уродинамическом исследовании – гиперактивность детрузора в фазе наполнения мочевого пузыря.

Для нейрогенного смешанного недержания мочи:

1. Наличие в анамнезе эпизодов недержания мочи, связанных с повелительными позывами к мочеиспусканию, иногда сопровождающемуся учащенным мочеиспусканем и ноктурией в сочетании с наличием в анамнезе эпизодов недержания мочи, связанных с физической нагрузкой, кашлем, чиханием, ходьбой, изменением положения тела или другими состояниями, приводящими к повышению внутрибрюшного давления.
2. Наличие в анамнезе неврологического заболевания, которое может быть патогенетической причиной недержания мочи и симптомов накопления мочи.
3. При физикальном обследовании – наличие положительной кашлевой пробы
4. При инструментальном обследовании - отсутствие остаточной мочи при

УЗИ.

Для нейрогенного дисфункционального мочеиспускания (детрузорно-сфинктерной диссинергии):

1. Наличие в анамнезе эпизодов недержания мочи в сочетании с хронической задержкой мочи.

2. Наличие в анамнезе неврологического заболевания, которое может быть патогенетической причиной расстройства мочеиспускания и симптомов накопления мочи.

3. При инструментальном обследовании - наличие остаточной мочи при УЗИ

4. При комплексном уродинамическом исследовании – наличие сокращения мочевого пузыря в фазе опорожнения при отсутствии расслабления сфинктера уретры и низкой скорости мочеиспускания/отсутствии мочеиспускания.

Для нейрогенной хронической задержки мочи:

1. Наличие в анамнезе хронической задержкой мочи.

2. Наличие в анамнезе неврологического заболевания, которое может быть патогенетической причиной задержки мочи.

3. При инструментальном обследовании - наличие остаточной мочи при УЗИ

4. При комплексном уродинамическом исследовании – отсутствие координированного сокращения мочевого пузыря в фазе опорожнения.

Основным критерием установки диагноза нейрогенной дисфункции мочеиспускания является наличие симптомов нижних мочевыводящих путей на фоне неврологического расстройства. Также к НДНМП относятся состояния, симптомы нижних мочевыводящих путей которых являются следствием лечения заболеваний органов таза (мультимодальное лечение, лучевая терапия и хирургические вмешательства), сопровождавшихся повреждением тазовых нервов [25].

Урологические симптомы накопления и опорожнения могут быть дебютом или единственным проявлением неврологического поражения. Иных, более четких критериев установки диагноза НДНМП, нет [30].

При НДНМП целью диагностики является установление типа нарушений. Тщательный сбор анамнеза, физикальное исследование и дневники мочеиспускания являются обязательными этапами, проводимыми до планирования каких-либо дополнительных методов исследования пациента. Результаты первичного обследования не всегда позволяют определить тактику лечения и наблюдения в отдаленной перспективе, и требуют более углубленного обследования.

- Рекомендуется при диагностике у всех пациентов с НДНМП оценивать неврологический статус, так как нарушения мочеиспускания вторичны и не всегда зависят от степени выраженности основного неврологического заболевания [31].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4)

Комментарии: *Ранняя диагностика и лечение имеют значение и при врожденных, и при приобретенных неврологических заболеваниях для профилактики необратимых изменений ВМП и НМП.*

2.1 Жалобы и анамнез

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на НДНМП в ходе сбора анамнеза собрать информацию о начале неврологического заболевания, появлении урологических симптомов с акцентом на ранее имевшиеся симптомы, включая функцию мочеиспускания, кишечника, сексуальную функцию, а также учитывать ранее отмечавшиеся и существующие на данный момент у пациента симптомы заболевания, для разработки последовательности и объема диагностических и лечебных процедур (Приложение Г4) [32, 33].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: *При нетравматическом характере НДНМП с постепенным началом и развитием нарушений подробный сбор анамнеза позволяет определить возрастной период появления симптомов (детский или подростковый). Урологические симптомы, связанные с фазой накопления и опорожнения, могут быть дебютом или единственным проявлением неврологического поражения. Наличие симптомов нарушения функции мочевого пузыря, кишечника и сексуальной функции без неврологических симптомов может свидетельствовать о неврологическом заболевании. Пациентам с нарушением чувствительности, например, при ПСМ, трудно точно описать симптомы нарушений мочеиспускания [34].*

- Рекомендуется у всех пациентов с подозрением на НДНМП для выявления сопутствующих нейрогенных дисфункций кишечника уточнить: частоту дефекаций; недержание кала; позывы к дефекации; характеристики дефекации; чувствительность прямой кишки [35].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: *скопления моторных и сенсорных нейронов, регулирующих работу*

кишечника и мочевого пузыря, находится на одном сегментарном спинномозговом уровне, что объясняет сочетанную симптоматику у данных пациентов.

- Рекомендуется пациентам с подозрением на НДНМП на диагностическом этапе вести дневники мочеиспускания (определение объема мочи) (Приложение Г2) для получения объективной информации о частоте мочеиспускания, об объеме порций мочи, количеству использованных абсорбирующих прокладок, наличии эпизодов НМ и ургентных позывов [36].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4)

Комментарии: *Определение частоты мочеиспусканий и выраженности симптомов нарушенного мочеиспускания представляет собой важный шаг в оценке и лечении дисфункции нижних мочевыводящих путей, включая НМ. Дневники мочеиспусканий относят к методу количественной оценки симптомов, включая количество эпизодов недержания мочи. Они также позволяют определить уродинамические параметры, например, объем мочеиспускания, суточный и ночной диурез. При применении метода периодической катетеризации необходимо в дневнике учитывать количество катетеризаций, выполненных в течение суток и объем выделенной мочи. Длительность ведения дневников мочеиспускания подбирается индивидуально, но целесообразно ведение дневников мочевого пузыря в течение 72 часов.*

- Рекомендуется при сборе анамнеза у всех пациентов с подозрением на НДНМП для субъективной оценки состояния пациента, страдающего НМ, использовать опросники и шкалы [37].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3)

Комментарии: *Валидизированные шкалы симптомов, специфические для заболевания, помогают в оценке выраженности симптомов, таких как интенсивность ургентных позывов. Опросники помогают в скрининге и дифференциации типов недержания мочи, в стандартизированной оценке симптомов. Кроме того, они используются для динамической оценки состояния пациента и эффективности лечения (Приложение Г1).*

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендуется у пациентов с НДНМП для верификации диагноза при физикальном обследовании выполнять пальпацию половых органов (пальпация при патологии

мужских половых органов, бимануальное влагалищное исследование). включающую оценку рефлексов в урогенитальной зоне, в особенности бульбокавернозного рефлекса и анального рефлекса (пальпация при патологии периферической нервной системы, исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы, пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга, исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга)[38].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: *Физикальное исследование включает определение чувствительности и рефлексов, опосредованных через нижние сегменты спинного мозга. Отклонения от нормы свидетельствуют о поражении на уровне крестцово-поясничных сегментов; топическая диагностика различных сенсорных нарушений позволяет определить локализацию патологического процесса. При осмотре промежности оценивается чувствительность на уровне S2–S5 сегментов (с обеих сторон). Оценивается поражение сегментов, наличие чувствительности (повышенная, нормальная, сниженная, отсутствует), тип восприятия тупых и острых предметов. Описываются рефлексы (усилены, нормальные, ослаблены, отсутствуют): бульбокавернозный рефлекс, анальный рефлекс, коленный и лодыжечный рефлексы, подошвенные рефлексы, кремастерные рефлексы).*

- Рекомендуется у мужчин с НДНМП выполнить трансректальное пальцевое исследование предстательной железы, тонуса анального сфинктера и мышц тазового дна с определением чувствительности урогенитальной зоны и оценкой состояния простаты и тазовых мышц (бимануальное ректоабдоминальное исследование), для подбора метода коррекции нейрогенных нарушений функции мочеиспускания с учетом индивидуальных особенностей [39, 40].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

- Рекомендуется у женщин с НДНМП выполнить трансректальное пальцевое исследование и вагинальное исследование с определением тонуса анального сфинктера и мышц тазового дна, чувствительности урогенитальной зоны, выявлением признаков опущения (пролапса) органов малого таза и оценкой анатомического и функционального состояния тазового дна (бимануальное

ректоабдоминальное исследование, бимануальное влагалищное исследование) для оценки эффективности методов коррекции нарушений накопительной и выделительной функции НМП, и принятия решения о дополнительном хирургическом вмешательстве [39, 40].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Тонус анального сфинктера описывается как: усиленный, нормальный, ослабленный, отсутствует. Также оценивается произвольное сокращение анального сфинктера и тазовых мышц: усиленное, нормальное, ослабленно, отсутствует.

2.3 Лабораторная диагностика

У пациентов с НДНМП необходимо следить за появлением признаков и симптомов возможного нарушения функции почек. Риск поражения ВМП при НДНМП выше при наличии высокого давления датрузора в фазу наполнения [41]. Риск развития почечной недостаточности значительно выше у пациентов с травмой спинного мозга или *spina bifida*, чем у пациентов с медленно прогрессирующими заболеваниями, включая РС и болезнь Паркинсона [41, 42].

- Рекомендуется всем пациентам с НДНМП для диагностики в условиях стационара, а также с целью подготовки к хирургическому лечению выполнять лабораторные тесты, включающие общие (клинические) анализы крови и мочи, анализ крови биохимический общетерапевтический (исследование уровня общего белка в крови, исследование уровня альбумина в крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня креатинина в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, исследование уровня натрия в крови, исследование уровня калия в крови, исследование уровня хлоридов в крови) коагулограмму (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме, исследование уровня фибриногена в крови, определение международного нормализованного отношения (МНО). [43].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Лабораторные исследования с целью подготовки к хирургическому лечению могут быть выполнены в условиях стационара у маломобильных пациентов.

- Рекомендуется в группе пациентов с НДНМП не проводить рутинный скрининг (общий (клинический) анализ мочи или микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева) на бессимптомную бактериурию в связи с отсутствием клинической значимости [44].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: *Бессимптомная бактериурия у мужчин определяется на основании выявления бактериального штамма в количестве $> 10^5$ КОЕ/мл в моче, выделенной самостоятельно. Бессимптомная бактериурия у женщин определяется на основании выявления одного и того же бактериального штамма в количестве $> 10^5$ КОЕ/мл в двух последовательных образцах мочи, выделенной самостоятельно. Бессимптомной бактериурии у мужчин и у женщин определяется при выделении бактериального штамма в количестве $> 10^4$ КОЕ/мл в моче, забранной из мочевого пузыря уретральным катетером [45].*

- Рекомендуется при наличии у пациентов с НДНМП таких симптомов как боль, гипертермия, а также гематурия, выполнение дополнительных обследований, включающих микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева с целью исключения инфекций мочевыводящих путей [5, 38].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: *Своевременно начатое лечение может предотвратить развитие необратимых изменений НМП и ВМП, в том числе восходящего пиелонефрита. Ретенционные изменения верхних мочевыводящих путей могут быть признаком пузирно-мочеточникового рефлюкса. При наличии бактериального воспаления мочевой системы пузирно-мочеточниковые рефлюксы могут привести к угрожающим жизни последствиям. Гематурия может быть признаком опухолевого поражения мочевой системы.*

2.4 Инструментальная диагностика

- Рекомендуется всем пациентам с НДНМП при первичном обращении и диспансерном наблюдении для неинвазивной визуализации изменений верхних и нижних мочевыводящих путей проводить ультразвуковое исследование почек и ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

[46].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Ультрасонография почек и мочевого пузыря не относится к специфическим методам обследования при НДНМП, однако основное значение ультрасонография приобретает как неинвазивный метод визуализации изменений ВМП и НМП, а также исследования объема остаточной мочи [47]. Это крайне важно для пациентов с высоким риском развития пузирно-мочеточниковых рефлюксов.

- Рекомендуется всем пациентам с НДНМП проводить измерение скорости потока мочи (урофлоуметрию), цистометрию для объективной оценки функции и дисфункции НМП, при этом неинвазивные уродинамические исследования должны предшествовать инвазивным [46, 47, 49].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Уродинамическое исследование является единственным методом, позволяющим определить и охарактеризовать функцию и дисфункцию нижних мочевыводящих путей, с отдельной оценкой сократительной способности детрузора и активности наружного сфинктера уретры, а также синергичность их расслабления и напряжения при мочеиспускании. Для получения достоверных результатов следует повторить исследование, если первое не было репрезентативным по мнению пациента и/или врача [47, 50].

Комплексное уродинамическое исследование заключается в выполнении ряда диагностических процедур:

- Неинвазивные методы:
 - измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) (при сохранении фазы опорожнения мочевого пузыря)
 - исследование объема остаточной мочи (ультразвуковое исследование или однократная катетеризация мочевого пузыря)
 - Инвазивные методы:
 - цистометрия
 - профилометрия внутриуретрального давления
- Рекомендуется всем пациентам с НДНМП выполнять измерение скорости потока мочи (урофлоуметрию) с последующим исследованием объема остаточной мочи (методом ультразвукового сканирования или путем однократной катетеризации

мочевого пузыря с измерением объема отводимой мочи) для оценки функции нижних мочевыводящих путей [47].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Урофлоуметрия может быть выполнена лишь у пациентов, способных осуществить самостоятельное мочеиспускание. К возможным ее отклонениям относятся: низкая скорость потока, снижение объема мочеиспускания, прерывание струи мочи, задержка начала мочеиспускания, а также наличие остаточной мочи. При интерпретации результатов исследования у пациентов, которые не могут осуществлять мочеиспускание в естественном (физиологическом) положении тела, следует учитывать, что положение тела может оказывать влияние как на характер мочеиспускания, так и на скорость потока мочи.

- Рекомендуется всем пациентам с НДНМП выполнять цистометрию наполнения и опорожнения для оценки функции нижних мочевыводящих путей [49].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Рекомендовано использовать физиологичную скорость наполнения мочевого пузыря и физиологический раствор с температурой, равной температуре тела [51]. Перед исследованием рекомендуется полностью опорожнить мочевой пузырь. При его наполнении следует использовать физиологическую скорость введения жидкости с температурой, равной температуре тела. К возможным отклонениям относятся: гиперактивность детрузора, низкая податливость (комплаентность) стенки, нарушение чувствительности мочевого пузыря, НМ, несостоятельность или расслабление уретры.

- Рекомендуется всем пациентам с НДНМП выполнять измерение скорости потока мочи (урофлоуметрию), цистометрию в сочетании с миционной цистоуретрографией для визуализации мочевыводящих путей в фазах наполнения и опорожнения мочевого пузыря [47, 49, 52].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Комбинация цистометрии наполнения и исследования давление/поток в сочетании с визуализацией (видеоуродинамическое исследование) является «золотым стандартом» при изучении уродинамики у пациентов с

НДНМП. В то же время, учитывая сложность выполнения этого исследования, оно может быть заменено на комплексное уродинамическое исследование в сочетании со стандартной миционной рентген-цистографией.

- Рекомендуется выполнение цистоскопии пациентам с НДНМП при наличии гематурии и/или длительного нарушения мочеиспускания для подтверждения или исключения новообразований слизистой мочевого пузыря и других патологических состояний мочевого пузыря и уретры [46,53].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: *При выполнении цистоскопии пациентам с неврологическими заболеваниями следует помнить об опасности непроизвольных спастических сокращений мышц нижних конечностей и риске развития автономной дисрефлексии. У ряда пациентов может потребоваться проведение рентгеноконтрастных исследований (миционной цистоуретрографии, опорожняющая цистоуретрография, уретрография восходящая), показания к которым при НДНМП четко не определены. При назначении таких исследований следует руководствоваться общими принципами и показаниями.*

2.5 Иная диагностика

Все пациенты с НДНМП нуждаются в консультации врача-невролога и /или нейрохирурга.

- Не рекомендуется рутинное выполнение специфических нейрофизиологических исследований (электромиография, изучение проводимости нервов) всем пациентам с НДНМП в связи с отсутствием показаний [53].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: *в некоторых случаях в ходе диагностического поиска и уродинамического обследования может возникнуть необходимость в использовании дополнительных неврологических тестов. К нейрофизиологическим тестам относят:*

- *электромиография (в нейрофизиологическом режиме) мышц тазового дна, уретрального сфинктера (электромиография игольчатая (одна мышца); электромиография накожная (одна анатомическая зона; регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов и/или анального сфинктера;*

- исследование проводимости по срамному нерву (измерение скорости проведения электрического импульса по нерву);
- определение латентного периода бульбокавернозного и анального рефлекса; определение вызванных потенциалов с клитора или головки полового члена (регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов); исследование чувствительности мочевого пузыря и уретры (суммарная электромиография наружного анального сфинктера или тазового дна) [54].

3. Лечение

Своевременно начатое лечение может предотвратить развитие необратимых изменений НМП и ВМП. Почечная недостаточность является основной причиной смертности пациентов, выживших после травматического ПСМ.

Приоритетными задачами при лечении пациентов с НДНМП являются:

- *защита функции почек и ВМП;*
- *обеспечение безопасного внутрипузырного давления; восстановление функций НМП;*
- *улучшение качества жизни пациентов.*

Сохранение давления детрузора в пределах безопасных значений, как в фазу наполнения, так и в фазу опорожнения мочевого пузыря создает безопасные условия для отведения мочи из ВМП в НМП и позволяет значительно уменьшить смертность от урологических причин у пациентов НДНМП [55]. Четкого определения безопасного давления не существует, но известно, что основным методом оценки функционального состояния НМ является комплексное уродинамическое исследование. Например, известно, что вместимость мочевого пузыря < 200 мл и давление детрузора > 75 см H₂O являются независимыми факторами риска повреждения ВМП у пациентов с ПСМ [55]. Подавление избыточного детрузорного давления может приводить к нарушению опорожнения мочевого пузыря, что необходимо учитывать при оценке эффективности лечения и контролльном обследовании. В этом случае пациентам предлагается метод отведения мочи, в основном – катетеризация мочевого пузыря.

- Рекомендуется для профилактики повреждения ВМП и улучшения отдаленных результатов, особенно у пациентов с ПСМ выше крестцового отдела или РС рекомендуется использовать комбинацию различных методов лечения (например, периодическая катетеризация и М-холиноблокаторы (АТХ - G04BD - средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи - антимускариновые препараты) [56, 57].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарий: *Также снижение детрузорного давления вносит вклад в сохранение механизма удержания мочи и, как следствие, в социальную реабилитацию пациента и*

качество жизни. Кроме того, это имеет важнейшее значение для профилактики ИМП [58].

3.1 Консервативное лечение

К консервативному лечению пациентов с НДНМП относят методы отведения мочи для компенсации эвакуаторной функции мочевого пузыря, медикаментозную коррекцию функции накопления мочи, а также медикаментозную терапию обострений ИМП.

У всех пациентов с НДНМП особое внимание обращается на поведенческую терапию, которая может заключаться в изменении питьевого режима и режима опорожнения мочевого пузыря методом периодической катетеризации. Например, установленным оптимальным объемом потребления жидкости для пациента с травмой спинного мозга, практикующего метод периодической катетеризации мочевого пузыря, является 1,5 литра жидкости в сутки [59]. Коррекция выявленных нарушений в виде увеличения количества потребляемой в сутки жидкости и нормализация режима катетеризации мочевого пузыря, позволяют снизить риск развития осложнений, таких как ИМП и улучшить качество жизни. Медикаментозная терапия зависит от вида НДНМП, при этом единой оптимальной медикаментозной схемы лечения НДНМП не существует.

- Рекомендуется периодическая асептическая катетеризация мочевого пузыря 4-6 раз в сутки как стандартный метод лечения пациентов с НДНМП с нарушением функции опорожнения мочевого пузыря [58, 59].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: Стерильная периодическая катетеризация не является рутинной манипуляцией. Асептическая периодическая катетеризация выступает в качестве альтернативы стерильной и является стандартным методом лечения пациентов с нарушением опорожнения мочевого пузыря. При асептической периодической катетеризации рекомендуемый диаметр катетера – 12-16 Ch. Оптимальная частота катетеризаций должна составлять 4-6 раз в сутки, при этом объем мочевого пузыря при катетеризации не должен превышать 400-500 мл. Риск инфекции мочевыводящих путей при использовании гидрофильных катетеров ниже на 54% [60].

- Рекомендуется избегать постоянной трансуретральной катетеризации и цистостомии у пациентов с НДНМП для снижения частоты осложнений [61].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: Постоянный уретральный катетер и, в меньшей степени, цистостомия связаны с различными осложнениями и риском ИМП [61]. В некоторых случаях, при невозможности осуществления полноценного ухода за пациентом (например, при отсутствии должного постоянного ухода и невозможности выполнения периодической катетеризации, из-за тетраплегии). При этом, в случае необходимости длительного дренирования постоянным уретральным или надлобковым катетером, предпочтение следует отдать дренажам медицинским силиконовым.

- Рекомендуется применение периферической электростимуляции двигательных нервов, например, тибионального нерва, для восстановления функции мочевого пузыря у пациентов с НДНМП, при наличии детрузорной гиперактивности. [62, 63]

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: известно, что сильное сокращение сфинктера уретры и/или мышц тазового дна, а также дилатация анального отдела, стимуляция генитальной области и физическая активность рефлекторно ингибируют мочеиспускание. Электрическая стимуляция афферентных волокон срамного нерва вызывает сильное подавление рефлекса мочеиспускания и сокращений детрузора [64]. Данный вид стимуляции может облегчить восстановление баланса между

активирующей и ингибирующей импульсацией на спинальном или супраспинальном уровнях. У пациентов с РС эффективность комбинированной терапии значительно превосходит эффективность лечения только с помощью электростимуляции. Предварительные данные свидетельствуют об эффективности и безопасности стимуляции большеберцового нерва и чрескожной электрической стимуляции в лечении НДНМП. У пациентов после инсульта чрескожная электрическая стимуляция позволяет улучшить уродинамические показатели и качество жизни. При лечении пациентов с неполными ПСМ или миеломенингоцеле внутрипузырная электростимуляция способствует увеличению емкости и растяжимости мочевого пузыря, а также усиливает ощущение наполнения мочевого пузыря. У пациентов с нейрогенной гипоактивностью детрузора внутрипузырная электростимуляция позволяет улучшить качество мочеиспускания и снизить объем остаточной мочи.

- Рекомендуется у пациентов с НДНМП для лечения нейрогенной гиперактивности детрузора, увеличения вместимости мочевого пузыря и уменьшения эпизодов НМ, в качестве первой линии терапии, применять монотерапию М-холиноблокаторами (антимускариновыми препаратами - G04BD: Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи) или спазмолитическими средствами, обладающими М-холиноблокирующим действием (АТХ- Спазмолитики в комбинации с прочими препаратами A03ED) [65].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1).

Комментарии: Препараты группы М-холиноблокаторов (G04BD: Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи), для лечения детрузорной гиперактивности, зарегистрированные на территории РФ:

- Солифенацин** - стартовая доза 10 мг x 1 раз в сутки
- Троспия хлорид - стартовая доза 15 мг x 3 раза в сутки
- Оксибутинин - стартовая доза 5 мг x 3 раза в сутки
- Толтеродин - 2 мг x 2 раза в сутки
- Фезотеродин 8 мг 1 раз в сутки

При неэффективности терапии у пациентов с неврологическими заболеваниями для максимального эффекта могут потребоваться более высокие дозы

антихолинергических препаратов (N04A: Антихолинергические средства) [66,67]. Препараты этой группы следует принимать постоянно при наличии симптомов гиперактивности мочевого пузыря,ющей эффективности и безопасности

- Рекомендуется у пациентов с нейрогенной детрузорной гиперактивностью при отсутствии эффекта от приема препаратов первой линии терапии с целью лечения НДНМП использование комбинации различных средств для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи - G04BD (М-холиноблокаторов) и спазмолитических средств, обладающих М-холиноблокирующим действием (АТХ – Спазмолитики в комбинации с прочими препаратами A03ED) [68]

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: М-холиноблокаторы (G04BD: Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи) с длительным высвобождением в меньшей степени вызывают ряд побочных эффектов, таких как сухость во рту [65]. Некоторые препараты, такие как оксибутинин, проникают через гематоэнцефалический барьер, и могут вызвать ухудшение когнитивных функций и должны с осторожностью назначаться больным с нарушениями когнитивных функций [69].

- Рекомендуется при нарушениях сократительной способности мочевого пузыря (гипоактивном детрузоре) не назначать пациентам антихолинэстеразные средства в связи с отсутствием доказанной эффективности [70].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: Применение препаратов группы ингибиторов холинэстеразы у пациентов с НДНМП требует осторожности. Ранее считалось, что антихолинэстеразные средства могут усиливать сократительную способность детрузора и улучшать опорожнение мочевого пузыря, но их рутинно не используют в клинической практике. Действие пиридостигмина бромида** и неостигмина метилсульфата** не изучено у этой категории пациентов.

- Рекомендуется для уменьшения инфравезикального сопротивления, уменьшения объема остаточной мочи и снижения риска автономной дисрефлексии мужчинам с НДНМП назначение альфа-адреноблокаторов [71-75]

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарий: Альфа-адреноблокаторы следует с осторожностью применять у пациентов, которые используют антигипертензивные средства или же страдают гипотонией, необходим контроль артериального давления на периферических артериях .

- Для этих целей используются препараты:
- # Тамсулозин** 0,4 мг x 1 раз в день #Силодозин - 8 мг x 1 раз в день

- Рекомендуется с осторожностью применение агонистов бета-3-адренорецепторов для снижения выраженности симптомов НДНМП, из-за того, что имеющийся достоверный опыт эффективного и безопасного применения препарата ограничен кругом нескольких распространенных неврологических заболеваний [76-79]

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарий: У пациентов с травмой спинного мозга или рассеянным склерозом была продемонстрирована тенденция к улучшению некоторых уродинамических показателей, за исключением детрузорной гиперактиности, при приеме мирабегрона в дозе 50 мг по сравнению с плацебо, а также значительно более низкая выраженность симптомов нижних мочевыводящих путей.

- Рекомендуется пациентам с НДНМП при бессимптомной бактериурии не проводить антибактериальную терапию, поскольку это приводит к формированию значительно более резистентных штаммов без улучшения результатов [80].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Основным критерием бессимптомной бактериурии следует считать отсутствие клинических проявлений ИМП при наличии бактериурии по общему анализу мочи и на основании бактериологического исследования мочи.

- Рекомендуется пациентам с клинически значимой ИМП назначение антибактериальных препаратов с учетом чувствительности бактериальной флоры мочи для элиминации инфекционных агентов [81, 82].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Не существует консенсуса по оптимальной длительности терапии ИМП. Как правило, рекомендуется 5-7-дневный курс антибактериальных препаратов, который можно продлить до 14 дней в зависимости от течения ИМП. Она зависит от тяжести ИМП и вовлечении в процесс почек и предстательной железы. Длительная антибактериальная терапия низкими дозами не снижает частоту ИМП, но повышает риск развития бактериальной резистентности. Выбор антибактериальных препаратов определяется по результатам бактериального исследования мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам. При необходимости проведения немедленного лечения (фебрильная температура, септицемия, непереносимые клинические симптомы, тяжелая автономная дисрефлексия) выбор препарата зависит от локальных и индивидуальных показателей резистентности.

3.2 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение пациентов с НДНМП включает малоинвазивные методики ботулинической терапии НМП и оперативные вмешательства по аугментации мочевого пузыря, хирургическую коррекцию функции наружного сфинктера уретры.

- Рекомендуется у пациентов с нейрогенной гиперактивностью детрузора при неэффективности консервативной терапии с целью уменьшения риска вторичных осложнений со стороны ВМП, снижения внутрипузырного давления, эндоскопическое хирургическое вмешательство - денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов (внутридетрузорная инъекция ботулинического токсина типа А**) [83, 84].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: На территории Российской Федерации используются препараты,

- имеющие зарегистрированные показания для введения в гладкую мускулатуру:
- ботулинический токсин типа A** – не менее 200 ЕД на одну процедуру.
 - ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс** – не менее 200 ЕД (онаботулотоксин) и не менее 600 ЕД (абоботулотоксин) на одну процедуру.
 - Внутридетрузорные инъекции препарата ботулинического токсина являются эффективным методом лечения НГД, рефрактерной к терапии М-холиноблокаторами (G04BD: Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи). Ботулинический токсин типа A** вызывает продолжительную (около 9-11 мес. в зависимости от используемого препарата), но обратимую химическую денервацию детрузора [85, 86]. При необходимости возможно повторное введение препарата, не ранее, чем через три месяца, с сохранением эффекта, даже при низких показателях ответа на первое введение. Самые частые осложнения включают ИМП и увеличение объема остаточной мочи. В ряде случаев требуется периодическая катетеризация. Редкие, но серьезные нежелательные явления включают автономную дисрефлексию и респираторные расстройства. Кроме того, описано развитие генерализованной мышечной слабости. Химическая денервация детрузора может потребовать периодической катетеризации мочевого пузыря [87, 88].
 - Рекомендуется у пациентов с НДНМП с детрузорно-сфинктерной диссинергией (ДСД) для уменьшения инфравезикального сопротивления малоинвазивное эндоскопическое хирургическое вмешательство - инъекция ботулинического токсина типа А в сфинктер [89].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4)

Комментарии: На территории Российской Федерации зарегистрирован препарат для введения в поперечнополосатую мускулатуру при ДСД:

- ботулинический токсин типа A** - 100 ЕД на одну процедуру
Достигаемый терапевтический эффект довольно низкий, метод возможно применять лишь с зарегистрированными для него указанными выше препаратами ботулинического нейропептида (ATX: M03AX01 - ботулинический токсин). Частота возможных осложнений оценивается как низкая [90].
- Рекомендуется сфинктеротомия (рассечение урогенитального сфинктера) или стентирование уретры (установка стента в мочевыводящие пути) у пациентов мужского пола с НДНМП при наличии тетраплегии, в случае невозможности

регулярного выполнения метода периодической катетеризации мочевого пузыря, при возможности использования уропрезерватива [91-93]

- Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарий: *Путем поэтапных трансуретральных разрезов зоны сфинктера можно снизить инфравезикальное сопротивление без нарушения замыкательной функции уретры. Во многих случаях сфинктеротомию необходимо выполнять повторно, данный метод имеет хорошую эффективность и не вызывает тяжелых осложнений [94].*

- Рекомендуется пациенткам с НДНМП и нейрогенным стрессовым НМ, которые могут осуществлять самокатетеризацию, выполнять слинговые операции при недержании мочи для улучшения результатов лечения [95, 96].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарий: *выполнение слинговых операций при недержании мочи имеет доказанную эффективность у женщин с нейрогенным стрессовым недержанием мочи, которые могут осуществлять самокатетеризацию, с приемлемыми среднес- и долгосрочными результатами. Увеличение инфравезикального сопротивления связано с риском повышения внутримочевого давления. Методы устранения сфинктерного недержания показаны только в тех случаях, когда детрузорная активность находится под контролем и отсутствует значимый ПМР. В ряде случаев показана одновременная реконструкция (аугментация) мочевого пузыря [90].*

- Рекомендуется мужчинам с нейрогенным стрессовым недержанием мочи сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера мочевого пузыря для улучшения результатов лечения [95].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

- Рекомендуется выполнение цистостомии пациентам с нарушением функции опорожнения мочевого пузыря в случаях невозможности использования периодической катетеризации при тетраплегии для уменьшения количества осложнений и улучшения качества жизни [96].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: При отсутствии условий для выполнения периодической катетеризации (патология мочеиспускательного канала, нарушенная функция рук), а также резкого снижения накопительной функции мочевого пузыря может использоваться цистостомия. У пациентов с длительной цистостомией всегда целесообразно проводить обследование с целью определения возможности перевода на периодическую катетеризацию.

- Рекомендуется реконструкция (аугментация) мочевого пузыря пациентам с НДНМП с целью уменьшения гиперактивности детрузора или улучшения накопительной способности мочевого пузыря, при неэффективности всех менее инвазивных методов лечения [97-100]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: Реконструкция (аугментация) мочевого пузыря является эффективным вмешательством для уменьшения давления детрузора и увеличения вместимости мочевого пузыря и служит единственной альтернативой при неэффективности менее инвазивных методов.

- Рекомендуется у пациентов с НДНМП с детрузорной гиперактивностью, рефрактерных к консервативному лечению с целью защиты ВМП и улучшения качества жизни пациента хирургическое лечение, направленное на увеличение емкости мочевого пузыря путем создания искусственного мочевого резервуара, в том числе с использованием сегмента кишки (радикальная цистэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого резервуара; радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара; операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)) [101-104]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Реконструкция (аугментация) мочевого пузыря может быть с сохранением собственного мочевого пузыря или полное замещение тканей кишечным трансплантом. Выбор метода последующего отведения мочи через катетеризируемую сухую стому или через естественные мочевыводящие пути зависит от технических возможностей проведения катетера в полость мочевого пузыря, и решается в каждом клиническом случае индивидуально. Катетеризируемая сухая стома может быть выведена (реконструкция мочевого

пузыря) в любом подходящем месте на передней брюшной стенке, чаще всего выбирается зона в области пупка из косметических соображений. Следует информировать пациента о высокой частоте послеоперационных осложнений, которые включают: стеноз стомы, формирование свищевого резервуара на коже, камни мочевого пузыря и перфорацию резервуара.

4. Реабилитация

Реабилитация пациентов с НДНМП осуществляется в рамках 1, 2 и 3 этапов реабилитации по поводу основного неврологического заболевания [105].

- Рекомендуется использование абсорбирующих средств пациентам, у которых лечение недержания мочи невозможно или же связано с высокими рисками [106, 107]

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарий: *Абсорбирующие средства имеют важное значение для лиц с НМ при неэффективности или невозможности лечения. Ряд пациентов отдают предпочтение устройствам по сбору мочи (уропрезервативы латексные), чем активному лечению со связанными с ним рисками. Эти устройства включают абсорбирующие прокладки, уретральные катетеры, внешние устройства для сбора мочи (уропрезервативы латексные), компрессионные устройства для мужчин (зажим для пениса при недержании мочи, многоразового использования) и интравагинальные устройства для женщин (пессарий для поддержания мочевого пузыря).*

- Рекомендуется применение методики периодической катетеризации мочевого пузыря с целью снижения частоты клинически значимой ИМП у пациентов с нарушением сократительной способности мочевого пузыря, а также у пациентов с нерасслабляющимся наружным сфинктером уретры [108].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1).

Комментарий: *Лубрицированные катетеры для самокатетеризации по способу лубрикации делятся на два типа:*

- *Катетер для самокатетеризации лубрицированный с зафиксированным гидрофильным покрытием;*
- *Катетер для самокатетеризации лубрицированный с незафиксированным гидрофильным покрытием^{1,2}.*

¹ ГОСТ Р 59449—2021. Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи

² Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 2021 г. № 106н “Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации”

- Рекомендуется при наличии сохранный способности частичного или полного произвольного сокращения мышц промежности пациентам с НДМП в результате острого нарушения мозгового кровообращения - тренировка мышц тазового дна, в том числе и с биологической обратной связью для улучшения результатов лечения [109, 110].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: Данная методика так же изучена у пациентов рассеянным склерозом [62, 63]. Возможно сочетание электростимуляции мышц с тренировками с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга.

5. Профилактика

Пациенты с НДНМП являются лицами с хроническим заболеванием, требующим пожизненного медицинского наблюдения, регулярного лабораторного и инструментального обследования и т.д. Поскольку НДНМП является не основным заболеванием, а следствием неврологической патологии (заболеваний или повреждений центральной или периферической нервной системы) профилактики развития нейрогенных нарушений мочеиспускания не существует. Целесообразно проводить своевременные методы диагностики дисфункции тазовых органов, в частности нарушений накопления и выделения мочи, и назначать оптимальный метод коррекции выявленных нарушений в ранний период возникновения основной неврологической патологии.

- Рекомендуется ежегодный осмотр пациентов с НДНМП у врача-уролога с проведением исследований: лабораторных (общий анализ мочи, мочевина и креатинин крови) и инструментальных (ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи, урофлоуметрия, цистометрия) для оценки состояния пациента в динамике [111].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: НДНМП часто имеют нестабильное течение и их симптомы могут значительно варьировать, вследствие чего требуется регулярное наблюдение. Состояние пациента может существенно изменяться даже в течение относительно короткого периода. В группе неврологических пациентов высокого риска этот интервал может быть намного короче. Любые клинически значимые изменения требуют дополнительного обследования [5,47]. Уродинамическое исследование показано как при первичной диагностике, так и при последующем наблюдении. Его необходимо чаще повторять пациентам группы высокого риска.

Организация оказания медицинской помощи

Показания для госпитализации в медицинскую организацию в плановом порядке:

- 1) для хирургического лечения НДНМП;
- 2) для проведения цистоскопии и цистометрии (в том числе с

анестезиологическим пособием) пациентам с тетраплегией и параплегией, и других групп неврологических пациентов с ограничением подвижности.

Показания к выписке пациента из стационара:

1. Восстановление полного или частичного удержания мочи у пациента с недержанием мочи;
2. Обеспечение опорожнения мочевого пузыря, самостоятельное или ассистированное, у пациента с нарушением опорожнения мочевого пузыря;
3. Обеспечение безопасности иальной функции верхних мочевыводящих путей.

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания

Адекватная компенсация нейрогенных нарушений мочеиспускания предполагает обеспечение пациента с НДНМП техническими средствами реабилитации и абилитации, специализированными медицинскими изделиями (Катетер уретральный баллонный постоянный для дренаажа, не антибактериальный; Прокладки впитывающие универсальные; Мочеприемник переносной, многоразового использования; Устройство для фиксации мочеприемника, носимое; Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, многоразового использования; Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания). Это может осуществляться за счет личных средств пациента или по линии государственного обеспечения. Для бесплатного обеспечения техническими средствами реабилитации (TCP) при нарушении функции выделения требуется направление пациента на медико-социальную экспертизу для присвоения лицу статуса инвалида и определения перечня необходимых медицинских изделий и технических средств реабилитации, которые вносятся в разработанную индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида.

Врач, направляющий пациента с НДНМП на медико-социальную экспертизу, должен подобрать вид и тип технического средства реабилитации и абилитации для конкретного пациента с учетом имеющихся нарушений функции выделения и клинических проявлений.

С учетом длительного, порой пожизненного использования методов компенсации нарушенной функции НМП пациент должен быть полностью обучен методу периодической самокатетеризации или должно быть проведено обучение принципам регулярной катетеризации лиц, ухаживающих за конкретным пациентом.

Рекомендуется предупреждать пациентов с повреждением спинного мозга или функциональными нарушениями спинного мозга, локализующимися на уровне сегмента T_{12} или выше о высоком риске развития автономной дисрефлексии [112].

К клиническим проявлениям автономной дисрефлексии относится головная боль, нечеткое зрение, заложенность носа, пилоэрекция, гиперемия лица, повышенное потоотделение выше уровня поражения (вазодилатация), бледность и холодная кожа (вазоконстрикция) ниже уровня поражения. Стимулом для развития автономной дисрефлексии может быть значительное растяжение мочевого пузыря или кишечника, сексуальная стимуляция или любой болевой стимул. Например,

ятрогенные стимулы во время цистоскопии или уродинамического исследования могут вызывать автономную дисрефлексию [36, 113].

Критерии оценки качества медицинской помощи

№	Критерии качества	Оценка выполнения
1.	Собран анамнез, в том числе включающий в себя информацию о начале неврологического заболевания, появлении урологических симптомов с акцентом на ранее имевшиеся или сохраняющиеся симптомы, включая функцию мочеиспускания, кишечника, сексуальную функции,	Да / Нет
2.	Заполнен дневник мочеиспусканий (определение объема мочи) и проведен его анализ у пациентов с сохраненным мочеиспусканием	Да / Нет
3.	Выполнен общий (клинический) анализ мочи с целью диагностики инфекции нижних мочевыводящих путей.	Да / Нет
4.	При подтверждении инфекции нижних выводящих путей выполнение микробиологического (культурального) исследования мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева	Да / Нет
5.	Выполнена оценка рефлексов в урогенитальной зоне, в особенности бульбокавернозного рефлекса и анального рефлекса	Да / Нет
6.	Выполнено измерение скорости потока мочи (урофлюметрия), исследование объема остаточной мочи, цистометрия	Да / Нет
7.	Назначена медикаментозная терапия гиперактивности детрузора и ургентного недержания мочи М-холиноблокатором (G04BD: Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи) (при отсутствии противопоказаний)	Да / Нет
8.	Назначена периодическая катетеризация мочевого пузыря пациентам, которые не могут полностью опорожнить мочевой пузырь,	Да / Нет
9.	При ургентном недержании мочи, рефрактерном к приему медикаментов, или при выраженных побочных эффектах или противопоказаниях к применению выполнено внутридетрузорное введение ботулинического токсина	Да / Нет

Список литературы

1. Fix, J.D., Neuroanatomy. 4th ed. 2008, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
2. Abrams, P., et al. Reviewing the ICS 2002 terminology report: the ongoing debate. *Neurourol Urodyn*, 2009. 28: 287. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19350662>
3. Клинические рекомендации Российского общества урологов под редакцией Ю.Г. Аляева, – М – 2017 г.
4. Nosseir, M., et al. Clinical usefulness of urodynamic assessment for maintenance of bladder function in patients with spinal cord injury. *Neurourol Urodyn*, 2007. 26: 228. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16998859>
5. Panicker, J.N., et al. Lower urinary tract dysfunction in the neurological patient: clinical assessment and management. *Lancet Neurol*, 2015. 14: 720. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26067125>
6. Tagliaferri, F., et al. A systematic review of brain injury epidemiology in Europe. *Acta Neurochir (Wien)*, 2006. 148: 255
7. Marinkovic, S.P., et al. Voiding and sexual dysfunction after cerebrovascular accidents. *J Urol*, 2001.: 359. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11176374>
8. Rotar, M., et al. Stroke patients who regain urinary continence in the first week after acute first-ever stroke have better prognosis than patients with persistent lower urinary tract dysfunction. *Neurourol Urodyn*, 2011. 30: 1315. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21488096>
9. Lobo, A., et al. Prevalence of dementia and major subtypes in Europe: A collaborative study of population-based cohorts. *Neurologic Diseases in the Elderly Research Group*. *Neurology*, 2000. 54: S4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10854354>
10. Grant, R.L., et al. First diagnosis and management of incontinence in older people with and without dementia in primary care: a cohort study using The Health Improvement Network primary care database. *PLoS Med*, 2013. 10: 1001. [\(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015113\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015113)
11. Pringsheim, T., et al. The prevalence of Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. *Mov Disord*, 2014. 29: 1583. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015113> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24976103> [\(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24976103\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24976103)
12. Ragab, M.M., et al. Idiopathic Parkinson's disease patients at the urologic clinic. *Neurourol Urodyn*, 2011. 30: 1258. [\(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24976103\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24976103)
13. Sakakibara, R., et al. A guideline for the management of bladder dysfunction in Parkinson's disease and other gait disorders. *Neurourol Urodyn*, 2015. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810035>
14. Dolecek, T.A., et al. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2005-2009. *Neuro Oncol*, 2012. 14 Suppl 5: v1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23095881>
15. Maurice-Williams, R.S. Micturition symptoms in frontal tumours. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 1974. 37: 431. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4365244>
16. Christensen, D., et al. Prevalence of cerebral palsy, co-occurring autism spectrum disorders, and motor functioning - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, USA, 2008. *Dev Med Child Neurol*, 2014. 56: 59. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117446>
17. Marciak, C., et al. Urinary incontinence in adults with cerebral palsy: prevalence, type, and effects on participation. *PM R*, 2014. 6: 110. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23978464>
18. Tagliaferri, F., et al. A systematic review of brain injury epidemiology in Europe. *Acta Neurochir (Wien)*, 2006. 148: 255. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16311842>
19. Kulakli, F., et al. Relationship between urinary dysfunction and clinical factors in patients with traumatic brain injury. *Brain Inj*, 2014. 28: 323. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24377376>
20. Singh, A., et al. Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury. *Clin Epidemiol*, 2014. 6: 309. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278785>

21. Weld, K.J., et al. Association of level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury. *Urology*, 2000. 55: 490.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10736489>
22. Kondo, A., et al. Neural tube defects: prevalence, etiology and prevention. *Int J Urol*, 2009. 16: 49. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19120526>
23. Sawin, K.J., et al. The National Spina Bifida Patient Registry: profile of a large cohort of participants from the first 10 clinics. *J Pediatr*, 2015. 166: 444.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25444012>
24. Bartolin, Z., et al. Relationship between clinical data and urodynamic findings in patients with lumbar intervertebral disk protrusion. *Urol Res*, 2002. 30: 219.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12202938>
25. Lange, M.M., et al. Urinary and sexual dysfunction after rectal cancer treatment. *Nat Rev Urol*, 2011. 8: 51. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21135876>
26. Daneshgari F1, Liu G, Birder L, Hanna-Mitchell AT, Chacko S. Diabetic bladder dysfunction: current translational knowledge. *J Urol*. 2009 Dec;182(6 Suppl):S18-26. doi: 10.1016/j.juro.2009.08.070.
27. Yuan, Z., et al. Diabetic cystopathy: A review. *J Diabetes*, 2015. 7: 442.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25619174>
28. Pugliatti, M., et al. The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. *Eur J Neurol*, 2006. 13: 700. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16834700>
29. de Seze, M., et al. The neurogenic bladder in multiple sclerosis: review of the literature and proposal of management guidelines. *Mult Scler*, 2007. 13: 915.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17881401>
30. Лопаткин Н.А. (ред.) Руководство по урологии. Том 2. М.: Медицина, 1998. - 768 с. - ISBN 5-225-04435-2.
31. Del Popolo, G., et al. Diagnosis and therapy for neurogenic bladder dysfunctions in multiple sclerosis patients. *Neurol Sci*, 2008. 29 Suppl 4: S352.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19089675>
32. Bors, E., et al. History and physical examination in neurological urology. *J Urol*, 1960. 83:759. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19089675>)
33. Klausner, A.P., et al. The neurogenic bladder: an update with management strategies for primary care physicians. *Med Clin North Am*, 2011. 95: 111.
(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13802958>)
34. Massa, L.M., et al. Validity, accuracy, and predictive value of urinary tract infection signs and symptoms in individuals with spinal cord injury on intermittent catheterization. *J Spinal Cord Med*, 2009. 32: 568.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025153>
35. Cameron, A.P., et al. The Severity of Bowel Dysfunction in Patients with Neurogenic Bladder. *J Urol*, 2015. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956470>
36. Honjo, H., et al. Impact of convenience void in a bladder diary with urinary perception grade to assess overactive bladder symptoms: a community-based study. *Neurorol Urodyn*, 2010. 29: 1286.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20878998>
37. Tsang, B., et al. A systematic review and comparison of questionnaires in the management of spinal cord injury, multiple sclerosis and the neurogenic bladder. *Neurorol Urodyn*, 2015.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620137> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620137>)
38. Tudor K. I., Sakakibara R., Panicker J. N. Neurogenic lower urinary tract dysfunction: evaluation and management //Journal of neurology. – 2016. – Т. 263. – №. 12. – С. 2555-2564.
39. Vodusek, D.B. Lower urinary tract and sexual dysfunction in neurological patients. *Eur Neurol*, 2014. 72: 109. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993182>
40. Labat, J.J., et al. Diagnostic criteria for pudendal neuralgia by pudendal nerve entrapment (Nantes criteria). *Neurorol Urodyn*, 2008. 27: 306.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17828787>

41. Ouyang, L., et al. Characteristics and survival of patients with end stage renal disease and spina bifida in the United States renal data system. *J Urol*, 2015. 193: 558. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25167993>
42. Thietje, R., et al. Mortality in patients with traumatic spinal cord injury: descriptive analysis of 62 deceased subjects. *J Spinal Cord Med*, 2011. 34: 482. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22118255>
43. Лопаткин Н.А. Урология. Клинические рекомендации (2-е издание). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 416 с
44. Mukai, S., et al. Retrospective study for risk factors for febrile UTI in spinal cord injury patients with routine concomitant intermittent catheterization in outpatient setting. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26458969>
45. Nicolle, L., et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults. *Clinical Infectious Diseases* 2005; 40:643–54. <https://academic.oup.com/cid/article/40/5/643/363229>
46. Goldmark E, Niver B, Ginsberg DA. Neurogenic bladder: from diagnosis to management. *Curr Urol Rep*. 2014;15(10):448
47. Przydacz M, Chlostka P, Corcos J. Recommendations for urological follow-up of patients with neurogenic bladder secondary to spinal cord injury. *Int Urol Nephrol*. 2018 Jun;50(6):1005-1016. doi: 10.1007/s11255-018-1852-7. Epub 2018 Mar 22. Review. PubMed PMID: 29569211
48. Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Р., Функциональная урология и уродинамика (монография) – М, 2013. – 375 с.
49. Schafer, W., et al. Good urodynamic practices: uroflowmetry, filling cystometry, and pressure-flow studies. *Neurourol Urodyn*, 2002. 21: 261. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11948720>
50. Bellucci, C.H., et al. Neurogenic lower urinary tract dysfunction--do we need same session repeat urodynamic investigations? *J Urol*, 2012. 187: 1318. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22341264>
51. Pannek, J., et al. Clinical usefulness of ultrasound assessment of detrusor wall thickness in patients with neurogenic lower urinary tract dysfunction due to spinal cord injury: Urodynamics made easy? *World J Urol*, 2013. 31: 659. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)
52. Ozkan, B., et al. Which factors predict upper urinary tract deterioration in overactive neurogenic bladder dysfunction? *Urology*, 2005. 66: 99. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15992868> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)
53. Podnar, S., et al. Lower urinary tract dysfunction in patients with peripheral nervous system lesions. *Handb Clin Neurol*, 2015. 130: 203. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26003246> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)
54. Chamberlain, J.D., et al. Mortality and longevity after a spinal cord injury: systematic review and meta-analysis. *Neuroepidemiology*, 2015. 44: 182. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25997873> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)
55. Madersbacher, H., et al. Neurogenic detrusor overactivity in adults: a review on efficacy, tolerability and safety of oral antimuscarinics. *Spinal Cord*, 2013. 51: 432. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743498> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)
56. Patel DP, Lenherr SM, Stoffel JT, Elliott SP, Welk B, Presson AP, Jha A, Rosenbluth J, Myers JB; Neurogenic Bladder Research Group. Study protocol: patient reported outcomes for bladder management strategies in spinal cord injury. *BMC Urol*. 2017 Oct 10;17(1):95. doi: 10.1186/s12894-017-0286-3. PMID: 29017505; PMCID: PMC5635498.
57. Jaggi A, Drake M, Siddiqui E, Fatoye F. A comparison of the treatment recommendations for neurogenic lower urinary tract dysfunction in the national institute for health and care excellence, European Association of Urology and international consultations on incontinence guidelines. *Neurourol Urodyn*. 2018 Sep;37(7):2273-2280. doi: 10.1002/nau.23581. Epub 2018 Apr 17. PMID: 29664124,
58. Drake, M., et al., *Conservative management in neuropathic urinary incontinence*, in *Incontinence*, P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury & A. Wein, Editors. 2013, Health Publication: Plymouth; 2013; pp. 827-1000 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)

59. Kiddoo, D., et al. Randomized Crossover Trial of Single Use Hydrophilic Coated vs Multiple Use Polyvinylchloride Catheters for Intermittent Catheterization to Determine Incidence of Urinary Infection. *J Urol*. 2015; 194: 174. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073657>)<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25584995> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25584995>)
60. Feng D, Cheng L, Bai Y, Yang Y, Han P. Outcomes comparison of hydrophilic and non-hydrophilic catheters for patients with intermittent catheterization: An updated meta-analysis. *Asian J Surg*. 2020 May;43(5):633-635. doi: 10.1016/j.asjsur.2019.12.009. Epub 2020 Jan 18. PMID: 31959575.
61. Park, Y.I., et al. A method to minimize indwelling catheter calcification and bladder stones in individuals with spinal cord injury. *J Spinal Cord Med*, 2001. 24: 105. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11587416> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25584995>)
62. Kabay SC, Yucel M, Kabay S. Acute effect of posterior tibial nerve stimulation on neurogenic detrusor overactivity in patients with multiple sclerosis: Urodynamic study. *Urology* 2008;71:641-5. (<https://doi.org/10.1016/j.urology.2007.11.135>)
63. de Sèze M, Raibaut P, Gallien P, et al. Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation for treatment of the overactive bladder syndrome in multiple sclerosis: Results of a multicentre prospective study. *Neurourol Urodyn* 2011;30:306-11. <https://doi.org/10.1002/nau.20958>
64. Gross, T., et al. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for Treating Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction: A Systematic Review. *Eur Urol*, 2016. 69:
65. Priya Madhuvrata , Manju Singh, Zaid Hasafa, Mohamed Abdel-Fattah, Anticholinergic drugs for adult neurogenic detrusor overactivity: a systematic review and meta-analysis, *Eur Urol* . 2012 Nov;62(5):816-30. doi: 10.1016/j.eururo.2012.02.036.
66. Horstmann, M., et al. Neurogenic bladder treatment by doubling the recommended antimuscarinic dosage. *Neurourol Urodyn*, 2006. 25: 441. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16847942> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397851>)
67. Bennett, N., et al. Can higher doses of oxybutynin improve efficacy in neurogenic bladder? *J Urol*, 2004. 171: 749. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14713802> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397851>)
68. Kosilov KV, Loparev SA, Ivanovskaya MA, Kosilova LV. Comparative effectiveness of combined low- and standard-dose trospium and solifenacin for moderate overactive bladder symptoms in elderly men and women. *Urol Int*. 2014;93(4):470-3. doi: 10.1159/000363658. Epub 2014 Aug 28. PMID: 25170796.
69. Isik, A.T., et al. Trospium and cognition in patients with late onset Alzheimer disease. *J Nutr Health Aging*, 2009. 13: 672. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19657549> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>)
70. Barendrecht, M.M., et al. Is the use of parasympathomimetics for treating an underactive urinary bladder evidence- based? *BJU Int*, 2007. 99: 749. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17233798> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>)
71. O'Riordan JI, Doherty C, Javed M, Brophy D, Hutchinson M, Quinlan D. Do alpha-blockers have a role in lower urinary tract dysfunction in multiple sclerosis? *JUrol*. 1995;153(4):1114-1116.
72. Kakizaki H, Ameda K, Kobayashi S, Tanaka H, Shibata T, Koyanagi T. Urodynamic effects of alpha1-blocker tamsulosin on voiding dysfunction in patients with neurogenic bladder. *Int J Urol*. 2003 Nov;10(11):576-81. doi: 10.1046/j.1442-2042.2003.00710.x. PMID: 14633081.
73. Abrams P, Amarenco G, Bakke A, Buczyński A, Castro-Diaz D, Harrison S, Kramer G, Marsik R, Prajsner A, Stöhrer M, Van Kerrebroeck P, Wyndaele JJ; European Tamsulosin Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction Study Group. Tamsulosin: efficacy and safety in patients with neurogenic lower urinary tract dysfunction due to suprasacral spinal cord injury. *J Urol*. 2003 Oct;170(4 Pt 1):1242-51. doi: 10.1097/01.ju.0000084623.65480.f8. PMID: 14501734.
74. Lee KS, Han DH, Lee YS, Choo MS, Yoo TK, Park HJ, Yoon H, Jeong H, Lee SJ, Kim H, Park WH. Efficacy and safety of tamsulosin for the treatment of non- neurogenic voiding dysfunction in females: a 8-week prospective study. *J Korean Med Sci*. 2010 Jan;25(1):117-22. doi: 10.3346/jkms.2010.25.1.117. Epub 2009 Dec 26. PMID: 20052356; PMCID: PMC2800025.
75. Stankovich EIu, Borisov VV, Demina TL. Tamsulozin v lechenii detrzorno- sfinkternoi dissinergii

- mochevogo puzyria u bol'nykh rasseiannym sklerozom [Tamsulosin in the treatment of detrusor-sphincter dyssynergia of the urinary bladder in patients with multiple sclerosis]. Urologiia. 2004 Jul-Aug;(4):48-51. Russian. PMID: 15457955.
76. Welk B, Hickling D, McKibbon M, Radomski S, Ethans K. A pilot randomized- controlled trial of the urodynamic efficacy of mirabegron for patients with neurogenic lower urinary tract dysfunction. *Neurorol Urodyn*. 2018 Nov;37(8):2810-2817. doi: 10.1002/nau.23774. Epub 2018 Aug 31. PMID: 30168626.
77. Krhut J, Borovička V, Bilková K, Sýkora R, Míka D, Mokříš J, Zachoval R. Efficacy and safety of mirabegron for the treatment of neurogenic detrusor overactivity-Prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Neurorol Urodyn*. 2018 Sep;37(7):2226-2233. doi: 10.1002/nau.23566. Epub 2018 Mar 31. Erratum in: *Neurorol Urodyn*. 2024 Jan;43(1):301. doi: 10.1002/nau.25272. PMID: 29603781.
78. Zhang D, Sun F, Yao H, Bao X, Wang D, Cui Y, Wu J. The Efficacy and Safety of Mirabegron for the Treatment of Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction: A Systematic Review and Meta-analysis. *Front Pharmacol*. 2021 Nov 18;12:756582. doi: 10.3389/fphar.2021.756582. PMID: 34867373; PMCID: PMC8636815.
79. Krebs J, Pannek J, Rademacher F, Wöllner J. Real-World Effects of Mirabegron in Patients with Chronic Neurogenic Detrusor Overactivity - A Retrospective Cohort Study. *Res Rep Urol*. 2020 May 22;12:187-192. doi: 10.2147/RRU.S253713. PMID: 32548077; PMCID: PMC7250696.
80. Everaert, K., et al. Urinary tract infections in spinal cord injury: prevention and treatment guidelines. *Acta Clin Belg*, 2009. 64: 335. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19810421> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
81. D'Hondt, F., et al. Urinary tract infections in patients with spinal cord injuries. *Curr Infect Dis Rep*, 2011. 13: 544. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21853416> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
82. Biering-Sorensen, F., et al. Urinary tract infections in patients with spinal cord lesions: treatment and prevention. *Drugs*, 2001. 61: 1275. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11511022> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
83. Cruz, F., et al. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA in patients with urinary incontinence due to neurogenic detrusor overactivity: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Eur Urol*, 2011. 60: 742. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
84. Schurch, B., et al. Botulinum toxin type a is a safe and effective treatment for neurogenic urinary incontinence: results of a single treatment, randomized, placebo controlled 6-month study. *J Urol*, 2005. 174: 196. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15947626> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
85. Mangera, A., et al. An updated systematic review and statistical comparison of standardised mean outcomes for the use of botulinum toxin in the management of lower urinary tract disorders. *Eur Urol*, 2014. 65: 981. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24239446> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
86. Averbeck, M.A., et al. Follow-up of the neuro-urological patient: a systematic review. *BJU Int*, 2015. 115 Suppl 6: 39. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5675201>)<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>)
87. Huang, M., et al. Effects of botulinum toxin A injections in spinal cord injury patients with detrusor overactivity and detrusor sphincter dyssynergia. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 2016. 48(8), 683-687.doi:10.2340/16501977-2132 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
88. Schurch, B., et al. Botulinum-A toxin as a treatment of detrusor-sphincter dyssynergia: a prospective study in 24 spinal cord injury patients. *J Urol*, 1996. 155: 1023.<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8583552> (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)
89. 5 - Dykstra DD, Sidi AA. Treatment of detrusor-sphincter dyssynergia with botulinum A toxin: a double-blind study. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 1990;71(1):24-6.
90. El-Azab, A.S., et al. Midurethral slings versus the standard pubovaginal slings for women with neurogenic stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J*, 2015.

- (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627993>)<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315169>
 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315169)
91. Vainrib M., Reyblat P., Ginsberg D.A. Long-term efficacy of repeat incisions of bladder neck/external sphincter in patients with spinal cord injury. *Urology*. 2014;84:940–945. doi: 10.1016/j.urology.2014.06.009.
 92. Ginsberg D.A., Boone T.B., Cameron A.P., Gousse A., Kaufman M.R., Keays E., Kennelly M.J., Lemack G.E., Rovner E.S., Souter L.H., et al. The AUA/SUFU Guideline on Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction: Treatment and Follow-up. *J. Urol.* 2021;206:1106–1113. doi: 10.1097/JU.0000000000002239..
 93. Chancellor MB, Bennett C, Simoneau AR, Finocchiaro MV, Kline C, Bennett JK, et al. Sphincteric stent versus external sphincterotomy in spinal cord injured men: prospective randomized multicenter trial. *Journal of Urology* 1999;161(6):1893-8
 94. Abdul-Rahman, A., et al. Long-term outcome of tension-free vaginal tape for treating stress incontinence in women with neuropathic bladders. *BJU Int*, 2010. 106: 827. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132201>
 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315169)
 95. Elliott, D.S., et al. Mayo Clinic long-term analysis of the functional durability of the AMS 800 artificial urinary sphincter: a review of 323 cases. *J Urol*, 1998. 159: 1206. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9507835>
 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315169)
 96. Weld, K.J., et al. Effect of bladder management on urological complications in spinal cord injured patients. *J Urol*, 2000. 163: 768. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10687973>
 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315169)
 97. Stohrer M, Castro-Diaz D, Chartier-Kastler E, et al. Guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. *Prog Urol*. 2007;17:703–55
 98. 6th International Consultation on Incontinence. Neurologic Urinary and Fecal Incontinence. In: Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A, editors. *Incontinence*. 16 ed. International Continence Society; 2017. pp. 1093–308
 99. Gor RA, Elliott SP. Surgical management of neurogenic lower urinary tract dysfunction. *Urol Clin North Am*. 2017;44:475–90. doi: 10.1016/j.ucl.2017.04.013
 100. Game X, Karsenty G, Chartier-Kastler E, et al. [Treatment of neurogenic detrusor hyperactivity: enterocystoplasty]. *Prog Urol*. 2007;17:584–96. doi: 10.1016/S1166-90
 101. Chen Z, Lu G, Li X, Li X, Fang Q, Ji H, et al. Better compliance contributes to better nocturnal continence with orthotopic ileal neobladder than ileocolonic neobladder after radical cystectomy for bladder cancer. *Urology* 2009;73(4):838-43; discussion 843-4,
 102. Khafagy M, Shaheed FA, Moneim TA. Ileocaecal vs ileal neobladder after radical cystectomy in patients with bladder cancer: a comparative study. *BJU International* 2006;97(4):799-804,
 103. Kristjansson A, Bajc M, Wallin L, Willner J, Mansson W. Renal function up to 16 years after conduit (refluxing or anti-reflux anastomosis) or continent urinary diversion. 2. Renal scarring and location of bacteriuria. *British Journal of Urology* 1995;76:546-50. [MEDLINE:],
 104. Shaaban AA, Abdel-Latif M, Mosbah A, Gad H, Eraky I, Ali-El-Dein B, et al. A randomized study comparing an antireflux system with a direct ureteric anastomosis in patients with orthotopic ileal neobladders. *BJU International* 2006;97(5):1057-62.].
 105. Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга. Руководство / под общ. ред. Г.Е. Ивановой [и др.]. – М., 2010. – 640 с.
 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315169)
 106. Getliffe K, Fader M, Cottenden A, Jamieson K, Green N. Absorbent products for incontinence: 'treatment effects' and impact on quality of life. *J Clin Nurs*. 2007 Oct;16(10):1936-45. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.01812.x. PMID: 17880482.
 107. Miget G, Moutounaick M, Kervinio F, Teng M, Chesnel C, Charlanes A, Le Breton F, Amarenco G. Place des protections dans la prise en charge de l'incontinence urinaire [Absorbent products for urinary incontinence management]. *Prog Urol*. 2018 Dec;28(17):953-961. French. doi: 10.1016/j.purol.2018.08.017. Epub 2018 Oct 22. PMID: 30361139].
 108. Li, L., et al. Impact of hydrophilic catheters on urinary tract infections in people with spinal cord injury: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Phys Med Rehabil*, 2013. 94: 782.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168400> (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20950307)
 109. Tibaek S., et al. Is Pelvic Floor Muscle Training Effective for Men With Poststroke Lower

- Urinary Tract Symptoms? A Single-Blinded Randomized, Controlled Trial. Am J Mens Health. 2017 Sep;11(5):1460-1471. doi:10.1177/0269215515578695 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5675201>)
110. Shin DC, Shin SH, Lee MM, Lee KJ, Song CH. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in female stroke patients: a randomized, controlled and blinded trial. Clin Rehabil. 2016 Mar;30(3):259-67. doi:10.1177/0269215515578695 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5675201>)
111. Averbeck, M.A., et al. Follow-up of the neuro-urological patient: a systematic review. BJU Int, 2015. 115 Suppl 6: 39. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
112. Wan D., et al. Life-threatening outcomes associated with autonomic dysreflexia: a clinical review. J Spinal Cord Med. 2014 Jan;37(1):2-10. doi: 10.1179/2045772313Y.0000000098
113. Liu N., et al. Autonomic dysreflexia severity during urodynamics and cystoscopy in individuals with spinal cord injury. Spinal Cord, 2013. 51: 863. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24060768>

Приложение А1. Состав рабочей группы

1. Касян Геворг Рудикович — доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, член Российского общества урологов.
2. Кривобородов Григорий Георгиевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и андрологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Российского общества урологов.
3. Гаджиева Заида Камалудиновна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела функциональных методов диагностики и лечения НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член Российского общества урологов.
4. Салюков Роман Вячеславович — доктор медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации института нейронаук и нейротехнологий ФГАОУ ВО РНИМУ Н.И. Пирогова Минздрава России, научный сотрудник ФГБУ РНЦРР Минздрава России, член Российского общества урологов.
5. Аль-Шукри Сальман Хасунович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии с курсом урологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПБГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, член Российского общества урологов
6. Строганов Роман Васильевич — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры урологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, член Российского общества урологов

Конфликт интересов: Все члены Рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

1. врачи-урологи
2. врачи-неврологи
3. врачи-нейрохирурги
4. врачи физической и реабилитационной медицины
5. врачи общей практики (семейные врачи)

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа
2	Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа
3	Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая
5	Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа
2	Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ с применением мета-анализа
3	Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль»
5	Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УУР	Расшифровка
A	Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными)
B	Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)
C	Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)


Порядок обновления клинических рекомендаций.

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Приложение А3. Связанные документы

1. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. N 907н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология»».
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2020 г. N 114н "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи"
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 137н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-уролог"
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 августа 2023 г. N 689н "О внесении изменений в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации"
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. N 342н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"

Приложение Б. Алгоритмы ведения пациента



Приложение В. Информация для пациентов

Нарушения функции тазовых органов и, в частности, нарушения мочеиспускания являются характерными проявлениями ряда неврологических заболеваний и повреждений центральной и периферической нервной системы.

Если у Вас неврологическое заболевание, на фоне которого развились нарушения мочеиспускания, то такое состояние требует специализированной медицинской помощи, которую оказывает врач-уролог.

Основным методом диагностики нейрогенной дисфункции мочеиспускания является комплексное урологическое обследование, которое заключается в измерении давления внутри мочевого пузыря и в брюшной полости во время наполнения мочевого пузыря стерильным физиологическим раствором и во время мочеиспускания.

Первостепенные задачи коррекции нейрогенных нарушений мочеиспускания заключаются следующем:

- создание условий для накопления достаточного объема мочи в мочевом пузыре — это
- примерно 300-500 мл; обеспечение низкого давления внутри мочевого пузыря в фазу
- накопления и при выделении мочи; исключения непроизвольного выделения мочи вне фазы опорожнения мочевого пузыря;
- снижение риска развития инфекции мочевыводящих путей, которому способствует наличие остаточной мочи, камни мочевыводящих путей, постоянные мочевыводящие дренажи и т.п.

При некоторых неврологических состояниях не всегда можно восстановить физиологическое мочеиспускание. В этом случае усилия врачей будут направлены на улучшение качества жизни (достижении определенного комфорта с применением средств ухода).

Приложение Г1. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Шкала симптомов нейрогенного мочевого пузыря – русская версия шкалы The Neurogenic Bladder Symptom Score (NBSS).

Источник: Филиппова Е.С. и соавт. Русскоязычная версия шкалы симптомов нейрогенного мочевого пузыря (NBSS). Урология. 2018;6:5-13. DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/urology.2018.6.5-13>

(<https://dx.doi.org/10.18565/urology.2018.6.5-13>). Оригинал: Welk, B., Morrow, S., Madarasz, W., Baverstock, R., Macnab, J., & Sequeira, K. (2014). The Validity and Reliability of the Neurogenic Bladder Symptom Score. The Journal of Urology, 192(2), 452–457. doi:10.1016/j.juro.2014.01.027

Тип: опросник для пациентов

Назначение: опросник подходит всем пациентам, независимо от характера НДНМП, наличия или отсутствия самостоятельного мочеиспускания и способа отведения мочи.

Шкала симптомов нейрогенного мочевого пузыря (The Neurogenic Bladder Symptom Score)		
<p>Вопросы данной анкеты, посвящены урологическим проблемам, которые Вы можете иметь. Пожалуйста, ответьте на них, выбирая только один ответ из предложенных для каждого вопроса. Заполнение анкеты займет у вас 5-10 минут.</p> <p>Отвечая на вопросы, думайте о том, как обычно работает Ваш мочевой пузырь и не берите во внимание временные изменения, связанные, например, с обострением инфекций.</p> <p>Вы можете ответить на все вопросы анкеты, независимо от того, мочитесь ли вы самостоятельно, используете катетеры или приспособления для сбора мочи, или перенесли операцию на мочевом пузыре.</p>		
1. В большинстве случаев я опорожняю мочевой пузырь:		
<input type="checkbox"/> через постоянный уретральный катетер или катетер для дренирования стомы в мочеприемник для взрослых, носимый, закрытый		A
<input type="checkbox"/>	в уропрезерватив (мочеприемник, носимый для пениса)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	с помощью катетера уретрального для однократного дренирования	C
<input checked="" type="checkbox"/>	мочусь самостоятельно в туалет	D
2. Как часто в течение дня у Вас непроизвольно подтекает моча (включая подтекание около катетера или цистостомы):		
<input checked="" type="checkbox"/> более чем один раз в день		4
<input type="checkbox"/>	около двух раз в день	3
<input checked="" type="checkbox"/>	несколько раз в неделю	2
<input checked="" type="checkbox"/>	редко	1
<input checked="" type="checkbox"/>	моча никогда непроизвольно не подтекает (0 баллов)	0
3. В течение дня непроизвольное подтекание мочи (включая подтекание около катетера или катетер для дренирования стомы) требует использования:		
<input checked="" type="checkbox"/> 3 и более прокладок		4
<input type="checkbox"/>	2 прокладки впитывающие универсальные	3
<input checked="" type="checkbox"/>	1 прокладка впитывающая универсальная	2
<input checked="" type="checkbox"/>	минимально и не требует использования прокладки	1
<input checked="" type="checkbox"/>	у меня не бывает непроизвольного подтекания мочи	0
4. В течение дня моча непроизвольно подтекает (включая подтекание около постоянного уретрального катетера) или в таком количестве, что:		
<input checked="" type="checkbox"/> белье/прокладки полностью промокают		4
белье/прокладки становятся мокрыми		3
<input checked="" type="checkbox"/>	белье/прокладки становятся влажными	2

<input type="checkbox"/>	моча не подтекает	0
5. Когда я сплю, объем непроизвольно выделившейся мочи (включая подтекание около катетера или катетер для дренирования стомы):		
большой (вещи полностью промокают)		4
средний (вещи становятся мокрыми)		3
небольшой (вещи становятся влажными)		2
минимальный		1
я не теряю мочу, когда сплю		0
6. Объем мочи, которую я непроизвольно теряю, зависит от количества выпитой мной жидкости:		
да, приходится постоянно ограничивать количество потребляемой жидкости		3
да, приходится иногда ограничивать количество потребляемой жидкости		2
нет, подтекание мочи не вынуждает меня сокращать объем потребляемой жидкости		1
нет, у меня не подтекает моча		0
7. Подтекание мочи приводит к проблемам с кожей:		
да, приходится обращаться к врачу по поводу проблем с кожей		3
да, но я в состоянии справиться с этими проблемами самостоятельно		2
нет, подтекание мочи не вызывает у меня проблем с кожей		1
нет, у меня нет подтекания мочи		0
8. Подтекание мочи вынуждает меня ограничивать виды деятельности, которыми я наслаждаюсь:		
да, приходится ограничивать любую деятельность		3
да, приходится отказываться от некоторых видов деятельности		2
нет, подтекание мочи не ограничивает мою активность		1
нет, у меня нет подтекания мочи		0
9. Внезапный позыв к мочеиспусканию (или спазм мочевого пузыря) случается:		
много раз за день		3
несколько раз за день		2
редко		1
никогда		0
10. Когда мне нужно помочиться (или вывести мочу катетером):		
необходимо сделать это немедленно, иначе моча выделится непроизвольно		3
необходимо сделать это в течение нескольких минут, иначе моча выделится непроизвольно		2
можно отложить это до удобного момента без риска непроизвольного подтекания мочи		1
я не думаю о мочеиспускании, так как использую катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный или катетер для дренирования стомы		0
11. Я просыпаюсь ночью, чтобы помочиться (вывести мочу катетером или опорожнить мочеприемник):		
три или более раз за ночь		4
дважды за ночь		3
один раз за ночь		2
редко		1
никогда		0

19. Для меня инфекция мочевыводящих путей:

часто приводит к необходимости в госпитализации	4
вынуждает постоянно принимать антибиотики	3
может быть вылечена дома с использованием антибиотиков, если необходимо	2
может быть вылечена без антибиотиков	1
не случается	0

20. Камни в почках образуются у меня:

чаще чем один раз в год	3
реже, чем один раз в год	2
были давно	1
никогда не было	0

21. Камни в мочевом пузыре образуются у меня:

чаще чем один раз в год	3
реже, чем один раз в год	2
были давно	1
никогда не было	0

22. Мне необходимо принимать медикаменты для моего мочевого пузыря (кроме антибиотиков):

да, но я их не принимаю	3
да, принимаю, но оно дают выраженные побочные эффекты	2
да, принимаю с минимальными побочными эффектами или без них	1
нет, я не нуждаюсь в таких препаратах	0

23. Я считаю, что препараты, которые я принимаю для моего мочевого пузыря:

не очень эффективны	3
частично эффективны	2
эффективны	1
я не принимаю лекарственных препаратов для мочевого пузыря	0

24. Если всю оставшуюся жизнь ваш мочевой пузырь будет работать так же, как сейчас, как вы будете себя чувствовать:

несчастным (-ой)	4
скорее неудовлетворенным (-ой)	3
удовлетворенным (-ой) и неудовлетворенным (-ой) одновременно	2
скорее удовлетворенным (-ой)	1
довольным (-ой)	0

Он состоит из 24 вопросов по доменам: недержание, накопление и опорожнение, осложнения, качество жизни. При интерпретации результатов опросника подсчитывается сумма баллов, полученных при заполнении документа. Оцениваться может общая сумма балов или сумма баллов, полученная в каждом из 5 доменов. Высокий бал коррелирует с более выраженными симптомами нижних мочевыводящих путей.

Nº	Подсчет баллов NBSS			
1	Способ отведения мочи	А- катетер для дренирования стомы или катетер уретральный баллонный постоянный для дренаажа, не антибактериальный В – уропрезерватив (мочеприемник, носимый для пениса), С - катетер уретральный для однократного дренирования/промывания D - самостоятельное мочеиспускание		
		Недержание	Накопление и опорожнение	Осложнения
2	Частота недержания днем	(0-4)		
3	Наполнение прокладок	(0-4)		
4	Количество прокладок	(0-4)		
5	Ночное недержание	(0-4)		
6	Ограничение жидкости	(0-3)		
7	Проблемы с кожей	(0-3)		
8	Ограничение активности	(0-3)		
9	Частота ургентных позывов		(0-3)	
10	Ургентность		(0-3)	
11	Ноктюрния		(0-4)	
12	Максимальный интервал		(0-3)	
13	Сухой промежуток	(0-4)		
14	Боль			(0-3)
15	Неполное опорожнение		(0-3)	
16	Струя		(0-3)	
17	Натуживание		(0-3)	
18	Частота инфекций			(0-4)
19	Тяжесть инфекций			(0-4)
20	Камни почек			(0-3)
21	Камни мочевого пузыря			(0-3)
22	Лекарственная терапия			(0-3)
23	Эффективность терапии			(0-3)
Сумма баллов по доменам		(0-29)	(0-22)	(0-23)
24	Качество жизни	(0-4)		

Ф.И.О. пациента Дата рождения:

Пол: М/Ж Дата заполнения: Страница дневника:

Время в 24 часовом формате	Объем выпущенной мочи (мл)	Необходимость напряжения живота при мочеиспускании (да, нет)	Подтекание мочи и его степень от 1 до 3*	Смена прокладки (да, нет)	Активность при подтекании (кашель, бег и т.д. или в покое)	Нестерпимый позыв и его степень по шкале от 1 до 10**	Выпito жидкости (мл)
Всего							

Как Вы оцениваете напор струи мочи, который Вы обычно имеете при мочеиспускании:
1 - струя отсутствует, моча выделяется по каплям; 2 - струя мочи значительно ослаблена;
3 - струя мочи незначительно ослаблена; 4 - нормальная струя мочи (обведите цифру, указывающую на устраивающий Вас ответ)

Как влияет имеющееся у Вас расстройство мочеиспускания на качество Вашей жизни и ежедневную активность: 1 - очень сильно влияет; 2 - умеренно влияет; 3 - незначительно влияет; 4 - никак не влияет (обведите цифру, указывающую на устраивающий Вас ответ)

Как бы Вы чувствовали себя, если бы Вам пришлось прожить с имеющимися у Вас расстройствами мочеиспускания до конца жизни: 1 - крайне неудовлетворенным; 2 - неудовлетворенным; 3 - практически нормально; 4 - абсолютно нормально (обведите цифру, указывающую на устраивающий Вас ответ)

Примечания к дневнику мочеиспусканий:

* 1 – незначительное, 2 – умеренное, 3 – сильное подтекание мочи, моча практически не удерживается.

** 1 самая слабая степень и 10 самая сильная степень нестерпимого позыва на мочеиспускание.

международной литературе

Заболевания, сопровождающиеся нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей	Частота в общей популяции	Тип и частота нейрогенной дисфункции мочеиспускания
Надмостовые и мостовые поражения и заболевания		
Цереброваскулярные заболевания (инфаркт)	450 случаев/100000/лет (Европа) [6] (10% случаев сердечно-сосудистой смертности).	Ноктурия - гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – (ургентное задержание мочи (УНМ) гиперактивность датрузора (другие виды нарушений встречаются реже) [7]. У 57-83% пациентов симптомы появляются в течение 1 месяца после инфаркта, у 71-80% наблюдается спонтанное восстановление через 6 месяцев. Сохранение НМ коррелирует с неблагоприятным прогнозом [8].
Деменция: болезнь Альцгеймера (80%), сосудистая (10%), другой этиологии (10%).	6,4% взрослых старше > 65 лет [9].	ГАМП-УНМ-гиперактивность датрузора 25% НМ при болезни Альцгеймера, > 25% при других типах деменции: деменция с тельцами Леви, нормотензивная гидроцефалия, болезнь Бинзенгера, Насу-Хакола и Пика [10]. У пожилых пациентов с деменцией НМ встречается в 3 раза чаще, чем у больных без нее [9].
Синдром Паркинсона Идиопатическая болезнь Паркинсона: 75-80% синдрома Паркинсона Паркинсонизм в сочетании (18%) с множественной системной атрофией, прогрессирующим супрануклеарным параличом, кортико базальной дегенерацией. Деменция с тельцами Леви. Вторичный паркинсонизм (2%)	Второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. С возрастом увеличивается распространенность идиопатической болезни Паркинсона [11]. Множественная системная атрофия является самой частой причиной синдрома Паркинсона.	Частота симптомов нарушенного мочеиспускания при дебюте заболевания составляет 30%, через 5 лет – 70%. Симптомы фазы накопления: ноктурия (78%) ГАМП – УНМ – гиперактивность датрузора [12]. ГАМП и гиперактивность датрузора развиваются в начальной фазе, а по мере прогрессирования заболевания появляется недостаточность внутреннего сфинктера и нарушение сократимости. Осложнения нейрогенной дисфункции мочеиспускания (инфекция) является одной из основных причин смертности при множественной системной атрофии [12,13].
Опухоли головного мозга	26,8/100000/год у взрослых (> 19 лет), (17,9 доброкачественные, 8,9 злокачественные) [14].	Недержание мочи развивается преимущественно при локализации в лобной доле (часть синдрома лобной доли или изолированной поражения лобной доли) [15].
Церебральный паралич	Церебральный паралич: 3,1-3,6/1000 у детей в возрасте 8 лет [16].	62% женщин и 58% мужчин с церебральным параличом страдают от НМ. У 70% гиперактивность датрузора. Рецидивные инфекции мочевыводящих путей (ИМП) и рентгенологические изменения встречаются в > 10% случаев [17].
Травма головного мозга	235/100000 в год [18].	Симптомы накопления – 44%, симптомы опорожнения – 38%, уродинамические нарушения – 60% [19].
Патология и заболевания от каудального отдела ствола мозга до крестцового отдела спинного мозга		
Повреждение спинного мозга (ПСМ)	Распространенность травмы спинного мозга в развитых странах варьирует от 280 до 906 на 1 млн. [20].	Нейрогенная гиперактивность датрузора и ДСД (до 95%) и гипоактивность датрузора (до 83%), в зависимости от уровня поражения [21].
Spina bifida	Spina bifida 3-4/10,000. Чаще всего встречается поясничная и пояснично-крестцовая формы (60%) [22].	Функция мочевого пузыря нарушена у 96% пациентов со spina bifida [23].
Наследственные спастические параплазии	Распространенность 2,3-9/100,000 [27]	Симптомы нарушенного мочеиспускания в 75% случаев, в основном ургентность и дисфункциональное мочеиспускание. У 81% больных определяется нейрогенная гиперактивность датрузора (из них у 76% в сочетании с ДСД) [27].
Патология и заболевания периферической нервной системы		
Дегенеративные заболевания поясничного отдела позвоночника Патология межпозвоночных дисков Дегенеративные заболевания Пролапс дисков Стеноз позвоночного канала в поясничном отделе	У мужчин (5%) и женщин (3%) >35 лет с болевым синдромом, связанным с пролапсом межпозвоночного диска. Встречаемость: около 5/100000/год Чаще у женщин возрастом > 45 лет.	У 26% затрудненное мочеиспускание и аконтрактальный датрузор [24]. Гипоактивность датрузора до (83%) [21].
Ятрогенные повреждения тазовых нервов	Рак прямой кишки. Рак шейки матки (мультимодальное лечение, лучевая терапия и хирургические вмешательства). Оперативное лечение эндометриоза.	После брюшно-промежностной резекции: у 50% острая задержка мочи. После тотальной мезоректальной эксцизии: у 10-30% нарушения мочеиспускания [25].
Периферическая нейропатия Сахарный диабет Другие причины периферической нейропатии, которые приводят к урологическим симптомам: злоупотребление алкоголем, герпес крестцово-поясничной области и генитальный герпес, синдром Гийена-Барре, порфирия, саркоидоз.	Распространенность сахарного диабета по всему миру, при котором проводится лечение, составляет 8,3% [26].	Ургентность/учащенное мочеиспускание +/- недержание мочи. На поздней стадии гипочувствительный и гипоактивный датрузор [27].

Диссеминированные заболевания центральной нервной системы		
Рассеянный склероз	Распространенность: 83/100 000 в Европе [44]	При дебюте рассеянного склероза у 10% пациентов отмечаются нарушения мочеиспускания, а у 75% больных они развиваются после 10 лет течения рассеянного склероза [45]. Гиперактивность детрузора: 65% [45], 45% [46]. ДСД: 35% [45, 46]. Гиповактивность детрузора: 25% [45]

Раздел анамнеза	Параметры для изучения
Отдаленный анамнез (детский возраст подростковый возраст – зрелый возраст)	Факторы риска наследственных или семейных заболеваний У женщин: менархе (возраст); может свидетельствовать о наличии метаболического нарушения Акушерский анамнез Наличие сахарного диабета Заболевания, например, РС, болезнь Паркинсона, энцефалит, сифилис Травмы и перенесенные операции, особенно с вовлечением спинного мозга и центральной нервной системы
Текущий анамнез	Применяемые лекарственные препараты Образ жизни (курение, алкоголь или прием препаратов); мочеиспускания, кишечника и сексуальную функцию Изменения качества жизни
Специфический урологический анамнез	Начало урологического заболевания Снижение выраженности симптомов после мочеиспускания; определение распространенности неврологического процесса при отсутствии обструктивной уропатии Изменение чувствительности мочевого пузыря Начало мочеиспускания (нормальное, спровоцированное, рефлекторное, затрудненное, прием Креде) Энуресис Характер и тип мочеиспускания (категоризация) Дневник мочеиспусканий: частота мочеиспусканий, объем мочеиспускания, недержание мочи и ургентные позывы
Сексуальный анамнез	Патология половых органов и симптомы нарушения сексуальной функции Чувствительность половых органов Специфический андрологический анамнез: эректильная функция, неполноценность или отсутствие оргазма, эякуляция Специфический гинекологический анамнез: диспареуния (неполноценность или дефицит) оргазмов
Анамнез нарушений функции толстого кишечника	Частота дефекаций и недержание кала Позывы к дефекации Характеристики дефекации Чувствительность прямой кишки Начало дефекации (пальцевая стимуляция прямой кишки)

Итого:
Пронумеровано
и прошнуровано 53

